TROISIÈME SUPPLÉMENT AUX FORMULAIRES

Puis distillez 180 grammes du liquide, et recueillez dans un récipient contenant.

Esprit-de-vin rectifié, 60 grammes.

Une goutte d'acide hydrocyanique d'Ittner égale trois gouttes d'acide hydrocyanique de la Pharmacopée hanovrienne de 1833.

5. **ACIDE** nitrique pur dilué.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Acide nitrique pur,	1 partie.
Eau distillée,	2 parties.

6 **ACIDE** muriatique pur dilué.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Acide muriatique pur,	1 partie.
Eau distillée,	2 parties.

Mêlez.

7. **ACIDE** pyroligneux brut.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Cet acide se prépare en distillant du bois sec.

Liqueur fauve, limpide, acide et très empyreumatique, c'est une dissolution d'acide acétique dans l'eau, de créosote, de picamare, de paraffine, d'Eupions, d'esprit de bois, et d'autres produits peu connus.

8. **ACIDE** pyroligneux rectifié.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Acide pyroligneux, A volonté

Distillez et recueillez les 3/4; conservez dans des flacons bien bouchés.

Semblable à la précédente, mais moins fauve et moins empyreumatique.

ACÉTONE.

9. **ACETONE.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Chaux vive,	1 partie.
Acétate de plomb cristallisé,	2 parties.

Mêlez exactement; distillez à sec, et purifiez le produit par du chlorure de calcium.

Liqueur incolore d'une odeur pénétrante particulière, d'une saveur mordante; soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Poids spéc. = 0,792 Ébullition, + 55°,6 c.

ALUMINE

10 **ALUMINE** pure.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Alun, Q. V.

Dissolvez dans eau distillée bouillante, 24 parties.

Remuez avec une spatule de bois, et ajoutez solution de carbonate de potasse jusqu'à ce que la liqueur soit légèrement alcaline, après digestion de quarante heures, laissez décanter et recueillez sur un filtre; dissolvez alors dans de l'acide chlorhydrique pur Q. S., précipitez ensuite par l'ammoniaque caustique jusqu'à ce que la liqueur soit alcaline, recueillez sur un filtre, séchez entre du papier non collé, et desséchez.

Poudre blanche, insoluble dans l'eau, sans odeur ni saveur, soluble dans l'acide sulfurique, l'ammoniaque caustique la précipite alors sous forme de gelée blanche; ce précipité est soluble dans la potasse caustique.

ANTHRAKOKALI.

11. **ANTHRAKOKALI.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Potasse caustique sèche,	5 parties.
Noir de fumée,	7 —

Faites une poudre sur le feu dans un mortier de fer.

BAINS.

12. **BAIN** alcalin contre les maladies de la peau, le lichen, le psoriasis, le prurigo.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Carbonate de soude du commerce,	125 grammes.
Eau,	300 litres.

Faites dissoudre le sel dans une petite quantité d'eau chaude, puis versez le soluté dans le bain.

13. **BAIN** de Baréges artificiel contre les maladies de la peau.

Hydrosulfate de soude cristallisé,	50 grammes.
Chlorure de sodium,	60 —
Carbonate de soude cristallisé,	60 —
Eau pure,	390 —

Faire dissoudre et conserver pour un bain.

14 **BAIN** d'iodure de potassium contre le lupus des membres et les maladies squammeuses. (Iodognosie.)

(*Formule de M. Cazenave.*)

Iodure potassique,	50 grammes.
Eau distillée,	450 —

Faites un soluté à verser dans une baignoire d'eau, pour un adulte. Ce bain n'exige pas une baignoire en bois.

15. BAIN de pieds alcalin contre le psoriasis plantaire et contre le prurit des orteils.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Carbonate de potasse,	125 grammes.
Eau,	Q. S.

16. BAIN de pieds mercuriel contre les exostoses et les tumeurs syphilitiques.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Sublimé corrosif,	2 décigr.
Eau,	1,000 grammes.

17. BAINS iodurés contre les maladies de la peau.

(*Formules du docteur Lugol.*)

Pour enfants.	N° 1.	N° 2.	N° 3.
Iodure de potassium,	15 grammes.	20	24
Iode,	8 —	10	12
Eau,	625 litres.	625	625

Pour adultes.	N° 1.	N° 2.	N° 3.
Iodure de potassium,	5 grammes.	6	8
Iode,	2,5 —	3	4
Eau,	300 litres.	300	300

Ces bains doivent être pris dans une baignoire en bois.

18. BAIN d'iodure de potassium ioduré contre les mêmes maladies et les accidents secondaires de la syphilis.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Iode,	10 grammes.
Iodure de potassium,	40 —
Eau distillée,	450 —

Faites un soluté à conserver pour être versé dans le bain qui devra être dans une baignoire en bois.

19. BAIN mercuriel contre les maladies chroniques de la peau, simples ou syphilitiques.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Sublimé corrosif,	8 à 15 grammes.
Eau distillée,	500 —

Faire dissoudre et verser dans une baignoire en bois avec Q. S. d'eau.

20. BAIN de savon contre la gale, le prurigo et le psoriasis.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Savon blanc,	1 kilogr.
Eau,	3 —

Faire dissoudre et ajouter au bain.

21. BAIN de sel marin contre les maladies scrofuleuses

(*Formule de M. Cazenave.*)

Sel commun,	1 kilogr.
Eau,	Q. S.

Pour un bain.

22. BAIN de Plombières (salino-gélatineux) contre les maladies de la peau.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Carbonate de soude,	58 grammes	5 centigr.
Sulfate de soude,	37 —	8 —
Chlorure de sodium,	10 —	9 —
Chlorure de calcium,	17 —	7 —
Gélatine,	17 —	6 —

Faites dissoudre, filtrez et conservez dans une bouteille, la gélatine étant à part dans un flacon ; on la fait dissoudre avant de l'ajouter au bain.

23. BAIN sulfureux contre la gale, la lèpre, le prurigo, etc.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Sulfure de potasse,	125 grammes.
Eau,	500 —

24. BAIN gélatino-sulfureux contre les maladies de la peau.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Sulfure de potasse,	125 grammes.
Eau,	500 —
Gélatine,	500 —

Dissoudre préalablement la gélatine dans 3 ou 4 kilogrammes d'eau chaude.

25. BAIN de Vichy contre les maladies de la peau.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Bicarbonate de soude,	1,000 grammes.
Chlorure de sodium,	30 —
Chlorure de calcium,	150 —
Sulfate de soude,	150 —
Sulfate de magnésie,	45 —
Sulfate de fer,	2 —


Pour un bain de 300 litres d'eau. On conserve les sels dans un flacon, et on en verse le contenu lorsqu'on veut prendre le bain.

BAUMES.

26. BAUME de Locatelli.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Cire jaune, 187 grammes 50 centigr.



Liquéfiez, à une douce chaleur, dans :
Huile d'olives, 345 grammes.
Térébenthine de Venise.

Après refroidissement, ajoutez :
Baume du Pérou, 31 gr. 25 centigr.
Bois de Santal rouge pulvérisé, 16 grammes.
Mêlez et conservez.

27. BAUME ophthalmique.

(Formule de M. Himly. — Pharmacopée hanovrienne.)

Baume noir du Pérou, 75 centigr.
Huile de lavande,
— de girofle,
— de rhue,
— de marjolaine,
— de serpolet, } āā 50 centigr.
Esprit-de-vin rectifié, 155 grammes.
Mêlez et filtrez.

28. BAUME vulnéraire anglais.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Racine de consoude,
Herbe d'armoise, } āā 61 gr. 50 centigr.
— de sauge,
— de bellis perennis,
Herbe de sanicle,
— d'aigremoine,
— d'absinthe,
— de fenouil,
— d'aristoloche,
— de primevère,
— de petite centaurée,
Herbe d'hysope,
— de menthe,
— de mélilot, } āā 31 gr. 50 centigr.
Esprit de vin rectifié, 4 kilogr.
Eau de fontaine, Q. S.
Distillez pour obtenir 6 kilogr., ajoutez :
Huile de thym, 70 gr. 50 centigr.
— de girofle, 24 grammes.
Vinaigre de vin,
Miel commun,
Sirop de cuisinier, } āā 2 kilogr.
Filtrez.

29. BAUME contre les engelures non ulcérées.

Essence de térébenthine, 4 grammes.
Acide sulfurique, 1 —
Huile d'olive, 10 —
Mêlez. Pour frictions, matin et soir.

30. BAUME Chiron ou de Lausanne contre les gerçures du sein et les engelures.

Huile d'olive, 300 grammes.
Térébenthine, 60 —
Cire jaune, 30 —
Orcanette, 15 —
Faire bouillir, passer et ajouter :
Baume du Pérou, 10 grammes.
Camphre, 6 décigr.
Remuer jusqu'à refroidissement; en friction employé comme cicatrisant.

31. BAUME mercuriel de Plenck contre les ulcères vénériens.

Mercure, 8 grammes.
Térébenthine, 4 —
Axonge, 24 —
Mercure doux, 1 — 15 centigr.
Onguent d'Arcæus, 24 —

BITARTRATES.

32. BITARTRATE de magnésie.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Acide tartrique, 125 grammes.
Eau distillée bouillante, 2,000 —
Dissolvez, ajoutez peu à peu
Carbonate de magnésie, 157 grammes.
Faites cristalliser.

BLEU.

33. BLEU de Prusse.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Prussiate de potasse et de fer, Q. S.
Dissolvez dans :
Eau distillée, 6 parties.
Ajoutez à la solution du muriate de fer oxydé, dissous dans de l'eau distillée, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; séparez ce dernier sur un filtre, lavez exactement et desséchez.

CAFÉINE.

34. CAFÉINE.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Précipitez, d'une décoction de café ou de thé, l'acide gallique et les autres substances, par l'acétate de plomb. Filtrez, évaporez à siccité, et, après avoir mêlé du sable à cette masse, sublimez comme pour la préparation de l'acide benzoïque.

Prismes blancs, soyeux, longs, tenus, d'une saveur amère, soluble dans 98 parties d'eau, dans 97 d'alcool, dans 194 d'éther, fusible à + 178° c., volatile à + 185°. Soluble dans l'acide muriatique, le tannin la précipite en blanc, le chlorure de platine en jaune; les acides sulfurique et muriatique forment avec elle des sels cristallisables.

CARBONATES.

35. **CARBONATE** de chaux précipité.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Chlorure de calcium (résidu de la préparation de la potasse caustique), dissolvez dans de l'eau de fontaine, ajoutez une solution de carbonate de soude jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité jaune ferrugineux. Décantez alors ou filtrez, et ajoutez une solution de carbonate de soude jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité blanc. Lavez d'abord le précipité avec l'eau de fontaine, puis avec l'eau distillée, jusqu'à ce que l'eau de lavage n'ait plus de saveur saline.

Poudre blanche.

36. **CARBONATE** de fer miellé.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Carbonate de soude cristallisé,	156 grammes.
Eau distillée,	625 —
Miel blanc,	31 gr 25 centigr.

Mêlez et versez la liqueur chaude dans un bocal, ajoutez alors :

Sulfate de fer préparé à chaud,	125 grammes.
Eau distillée bouillante,	625 —
Miel blanc,	31 gr. 25 centigr

Versez, tandis que la solution est chaude, sur la solution précédente; si le bocal n'est pas rempli, ajoutez de l'eau distillée bouillante, Q S

Le précipité blanc sera lavé par de l'eau distillée bouillante, tenant en dissolution 30 grammes de miel, comprimez le précipité le plus possible, ajoutez alors :

Miel, 62 gr. 50 centigr.

Ce miel doit être évaporé pour lui faire perdre son eau, ajoutez ensuite :

Racine d'althea pulvérisée, 16 grammes.

Mêlez bien et conservez dans des flacons bien bouchés.

4 grammes contiennent environ 2 grammes de carbonate de fer.

CÉRATS.

37. **CÉRAT** de calamine (*cérat de Turner*) contre les excoriations, les fissures, les gerçures du sein

Calamine préparée,	125 grammes.
Cire jaune,	125 —
Axonge,	374 —

Mêlez la cire à l'axonge, et lorsque le mélange commence à s'épaissir à cause de son refroidissement, ajoutez la calamine en agitant jusqu'à entier refroidissement.

CHLORURES.

38. **CHLORURE** de baryum (*mixture du professeur Lauth*) pour combattre la syphilis avec affection scrofuleuse et tempérament lymphatique.

Pour un adulte.

Muriate de baryte,	3 gr. 60 centigr.
Eau,	100 grammes.
Teinture stomachique de Whyt,	30 —

Pour un enfant de six ans, la dose du muriate de baryte est de 1 gr 80 c.
Pour un enfant de quatre ans, de 1 — 20 —
Pour un enfant de deux ans, de 0 — 60 —
Même quantité d'eau.

La dose est d'une cuillerée à soupe quelques heures après le déjeuner.

39. **CHLORURE** de calcium pour bains.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

C'est le résidu de la fabrication de l'ammoniaque, desséché et contenant des quantités diverses d'alumine, de magnésie, de silice et de fer.

CHLOROFORME.

40. **CHLOROFORME.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Chlorure de chaux,	6,500
Eau de fontaine,	5,625
Esprit de vin rectifié,	2,000

Mêlez exactement et distillez dans des appareils en cuivre étamé; refroidissez le récipient avec de l'eau froide ou mieux avec de la neige ou de la glace; distillez jusqu'à ce que l'eau qui passe à la distillation soit sans odeur; lavez alors le chloroforme à l'eau distillée pour enlever l'alcool, le chlore et l'acide hydrochlorique. S'il noircit par l'acide sulfurique, distil-

lez-le de nouveau, conservez sous l'eau dans des flacons bien bouchés.

Liquide limpide, d'une odeur agréable, éthérée, doux au goût, neutre, il entre en ébullition à + 81° c., ; poids spécifique = 1,48. Soluble en toute proportion dans l'alcool et l'éther, ni le nitrate d'argent, ni l'eau, ne la troublent. L'albumine ne se coagule pas quand on l'y ajoute. L'acide sulfurique concentré ne le noircit pas quand il est pur.

CITRATES.

41. CITRATE de fer et de quinine.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Citrate de fer, dissolvez dans une assez grande quantité d'eau, ajoutez de la quinine autant qu'il s'en dissout.

Évaporez à siccité.

COLLODIONS.

42. COLLODION.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Nitrate de potasse,	20 parties.
Acide sulfurique anglais,	30 —
Ouate,	1 partie.

Faites macérer pendant trois minutes, lavez, exprimez et desséchez.

Deux parties de ce coton seront dissoutes dans :

Éther sulfurique,	30 parties.
Alcool,	2 —

Conservez en vase bien clos.

43. COLLODION cantharidal.

(*Pharmacopée hanovrienne*).

Cantharides contuses, 500 grammes.

Faites une teinture dans :

Éther sulfurique,	500 grammes.
— acétique,	93 gram. 75 décigr.

Dans 62 grammes de cette teinture, dissolvez :

Coton-poudre, 75 centigrammes.

Conservez.

CONSERVES.

44. CONSERVE de roses.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Fleurs de roses rouges en poudre,	47 grammes.

Faites macérer dans un bain de vapeur, en vase clos, pendant une heure avec :

Eau de roses, 125 grammes.

Agitez au moyen d'une spatule en bois, et ajoutez :

Sucre blanc en poudre, 500 grammes.

F. S. A. une conserve, en employant un mortier de marbre.

CONINE.

45. CONINE.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Semences du *conium maculatum* contuses,	2 kilogrammes.
Eau,	12 —
Chaux éteinte,	1 —
Carbonate de potasse,	500 grammes.

Mêlez bien, et distillez aussi longtemps que l'eau qui passe à la distillation a une odeur de conine, saturez alors par l'acide sulfurique, évaporez jusqu'à consistance sirupeuse. Traitez le résidu par un mélange d'une partie d'éther et de deux parties d'alcool, décantez et ajoutez de l'eau au résidu, en petite quantité et à une douce chaleur, au bain-marie, aussi longtemps que tout l'esprit soit enlevé. Traitez alors la liqueur avec environ la moitié de son poids d'une lessive de potasse caustique, et distillez à siccité. Ajoutez au résidu une nouvelle quantité de lessive, et distillez de nouveau ; répétez cette opération jusqu'à ce que l'eau, passant à la distillation, n'ait plus d'odeur de conine. La conine se sépare de l'eau, elle est suffisamment pure pour l'usage médicinal.

Liquide incolore, huileux, d'une densité de 0,89, d'une odeur nauséeuse, pénétrante ; entrant en ébullition à + 170°, très inflammable, soluble dans 100 parties d'eau et dans 6 parties d'éther, se mêlant à l'alcool en toute proportion. La conine et les sels en dissolution, se colorent en brun à l'air. Très vénéneuse.

DÉCOCTIONS.

46. DÉCOCTION douce.

(*Formule de Zittmann. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Résidu de la décoction suivante.

Ajoutez :

Racine de salsepareille, 8 grammes

Faites cuire dans :

Eau de fontaine, 1 kilogramme.

A la fin de la cuisson, ajoutez :

Écorce de citron, Cannelle de Ceylan, Cardamomum, Racine de réglisse,	[illegible] 35 centigrammes

Faites 500 grammes de colature.

47. **DÉCOCTION forte.**

(*Formule de Zittmann. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Racine de salsepareille concassée, 16 grammes.
Sucre, 75 centigr.
Aloès, 75 —
Calomel, 50 —
Cinabre, 12 —

Ces deux dernières substances renfermées dans un sachet de toile.

Faites une décoction avec :

Eau de fontaine, 1 kilogramme.

Ajoutez à la fin de la décoction

Feuilles de séné, 4 grammes.
Racines de réglisse concassées, 2 —
Semences d'anis, 50 centigr.
— de fenouil, 50 —

Faites une colature de 500 grammes.

48. **DÉCOCTION de rhamnus frangula.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Écorce de rhamnus, 16 grammes.

Faites une décoction dans suffisante quantité d'eau de fontaine, pour obtenir 218 grammes 75 centigrammes. Ajoutez :

Racine de rhubarbe, 4 grammes.
Cônes de houblon, 1 gramme 30 centigr.
Semences de chardon marie, 1 — 30 —

Laissez digérer pendant deux heures dans un lieu froid, et recueillez.

DEXTRINE.

49. **DEXTRINE.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Amidon, 100 parties.
Eau à + 50° R., 40 —

Mêlez, chauffez à + 75° R., et agitez continuellement avec

Malt d'orge, 2 parties.

et avec

Mucilage de graine de lin, 1 partie.

Continuez jusqu'à ce que la masse ne bleuisse plus par la teinture d'iode. Decantez, clarifiez et évaporez à une douce chaleur, réduisez en poudre, qui doit être blanche, insipide, soluble dans l'eau, non colorable en bleu par l'iode.

EAUX.

50. **EAU d'euphraise.**

Herbe récente d'euphraise, 1,000 gramm.
Eau de fontaine, 5,000 —

Distillez pour obtenir 1,000 grammes.

51. **EAU antimiasmatique.**

(*Formule de Koechlin.—Pharmac. hanovrienne.*)

Hydrochlorate de cuivre liquide, 8 grammes.
Eau distillée, 625 —

52. **EAU créosotée.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Créosote, 4 grammes.
Eau distillée, 16 —

Mêlez et agitez souvent, jusqu'à ce que la créosote soit en partie dissoute.

53. **EAU distillée d'assa fœtida.**

(*Pharmacopée prussienne.*)

Assa-fœtida, 12 grammes.

Ajoutez eau de fontaine Q. S. et distillez pour recueillir 187 grammes.

Liqueur trouble.

54. **EAU distillée de castoreum.**

(*Pharmacopée du Wurtemberg.*)

Castoreum de Sibérie, 31 gr. 25 centig.
Eau, Q. S.

Distillez pour obtenir 2 litres de liquide.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Castoreum anglais, 125 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 125 —
Eau commune, Q. S.

Après douze heures de macération distiller et recueillez 1 kilogramme d'eau.

55. **EAU divine.**

Pierre divine, 50 centigrammes.
Eau distillée. 30 grammes.

Dissolvez.

56. **EAU de glands de Rademacher.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Glands récents decortiqués, 5,000 gramm.
Esprit-de-vin rectifié, 468 —
Eau de fontaine, Q. S.

Distillez pour obtenir 3,500 grammes

57. **EAU de goudron.**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Poix liquide, 500 grammes.
Eau distillée, 2,000 —

Mêlez souvent, agitez, laissez reposer et décantez le liquide clair.

58. **EAU** mercurielle noire.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Calomel, 4 grammes.
Eau de chaux, 500 —

Mêlez.

59. **EAU** de nicotiane.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de nicotiane rustique récente, 4 kilogramm.
Esprit-de-vin rectifié, 750 grammes.
Eau de fontaine, Q. S.

Distillez pour obtenir 4 kilogrammes.

60 **EAU** de noix vomique.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Noix vomiques contuses, 1,000 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 63 gr. 75 centig.
Eau de fontaine, Q. S.

Faites macérer en vase clos pendant vingt-quatre heures et recueillez par distillation 1,500 grammes.

61. **EAU** d'opium.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Opium divisé, 31 grammes 25 centigr.

Mettez dans une cornue en verre et chauffez avec :

Eau commune, 375 grammes.

Distillez et recueillez 167 gr. 50 centigr. Conservez dans des vases bien bouchés.

62. **EAU** anti-ophthalmique.

(*Formule de Schroeder. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Sucre, 16 grammes.
Vitriol blanc, 62 — 50 centigr.
Eau de rose, 250 —
Eau de sureau, 250 —

F. S. A.

63. **EAU** de persil.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Huile de persil, 1 goutte.
Eau distillée, 125 grammes.

Mêlez exactement et filtrez.

64. **EAU** de pulsatille.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de pulsatille récente, 1,000 grammes.
Eau de fontaine, 4,000 —

Obtenez par distillation 1 kilogramme d'eau qui sera conservée dans de petites fioles bien bouchées et placées dans un lieu frais.

65. **EAU** de quassia.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Bois de quassia découpé, 1,500 grammes.
Ecorces de quassia concassées, 281 gr. 25 centigr.
Esprit-de-vin rectifié, 500 grammes.
Eau, Q. S.

Laissez macérer pendant quarante-huit heures et distillez pour obtenir 4,000 grammes.

66. **EAU** de rue.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Huile de rhue, 1 goutte.
Eau distillée, 62 grammes 50 centigr.

Mêlez exactement et filtrez.

67. **EAU** saturnine.

(*Formule de Serturner. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Oxyde de plomb hydrate, 31 gr. 25 centigr.
Eau distillée, 125 grammes.

Mélangez.

ÉLECTUAIRES.

68. **ÉLECTUAIRE** de Himly.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Poudre de bois de gaïac,		15 gram.
— de racine d'impératoire,		15 —
— de feuille de séné,		15 —
— de racine d'aunée,	}	
— de racine de jalap,	} ãã	6 —
— d'écorces de sassafras,	}	
— de baies de genièvre,	}	
— de semences d'anis,		4 —
Miel,		200 —

Mêlez.

ÉLIXIRS.


69. **ÉLIXIR** Cholagogue.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Aloès, 32 grammes.
Racine de gentiane, 16 —
Myrrhe, 8 —
Esprit-de-vin rectifié, 469 —

Après digestion suffisante dissolvez dans la colature :

Extrait d'absinthe, 8 grammes.
Acide sulfurique dilué, 16 —



70. **ELIXIR** pectoral.

(*Formule de Wedell. — Pharmac. hanovrienne.*)

Racine d'aunée, — d'iris de Florence, — de scille, Bois de santal rouge, Racine de réglisse,	ãã	31 gr. 25 centigr.
Semences d'anis, Myrrhe,	ãã	16 grammes.
Benjoin,		24 —
Safran,		12 —
Gomme ammoniaque,		8 —
Esprit-de-vin rectifié,		1,000 —

Faites digérer pendant six jours, exprimez et filtrez.

EMPLATRES.

71. **EMPLATRE** anti-arthritique.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Emplâtre de savon, 31 grammes.
Camphre, 5 gr. 20 centigr.
Castoreum du Canada, 2 — 60 —

Mêlez et faites fondre dans une capsule.

72. **EMPLATRE** balsamique.

(*Formule de Schiffhout. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Céruse en poudre fine, 1 kilogramme.
Minium — — 1 —
Huile d'olives, Q. S.

Liquéfiez à un feu doux en agitant continuellement jusqu'à consistance d'emplâtre; ajoutez :

Savon de Venise en poudre, 500 grammes.
Castoreum de Sibérie, 6 —
Camphre, 96 —

73. **EMPLATRE** de fer.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Sous-carbonate de fer, 100 grammes.
Emplâtre ordinaire, 748 —
Poix de Bourgogne, 187 —

Ajoutez le sous-carbonate de fer à l'emplâtre ordinaire et à la poix de Bourgogne préalablement fondus ensemble, remuez continuellement jusqu'à épaississement et refroidissement.

74. **EMPLATRE** de tartre stibié.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Tartre stibié finement pulvérisé, 4 grammes.
Résine de poix, 8 —
M. S. A.

75. **EMPLOI** de la morphine et de la quinine contre les fièvres intermittentes.

(*Formule du docteur J. Hannon.*)

Sulfate de quinine, 20 grains.
Sucre, Q. S.

Pour faire 5 paquets.

Extrait gommeux d'opium, 5 grains.
Hydrochlorate de morphine, 1 —
Extrait de valériane, 20 —

Pour faire 15 pilules.

On prend, au début de l'accès, 1 pilule, immédiatement après l'accès, 1 paquet de poudre, pendant l'apyrexie, jusqu'au moment de l'accès, un nombre de pilules opiacées en rapport avec la constitution du malade.

ERGOTINE.

76. **ERGOTINE**

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Seigle ergoté, Q. V.

Faites une macération avec eau froide, chauffez au bain-marie jusqu'à coagulation, filtrez, évaporez au bain-marie jusqu'à consistance sirupeuse ; ajoutez :

Alcool, Q. S.

Pour précipiter la matière gommeuse, filtrez la liqueur limpide et évaporez jusqu'à consistance d'extrait mou.

ÉTHERS.

77. **ETHER** musqué

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Musc, 1 gr. 30 centigr.
Ether sulfurique, 60 grammes.

Mêlez et décantez.

EXTRAITS.

78. **EXTRAIT** alcoolique de rhubarbe.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Rhubarbe en poudre grossière, 374 grammes.
Alcool dilué, Q. S.

Mêlez la rhubarbe avec son poids de sable grossier, arrosez-les largement d'alcool dilué, et après vingt-quatre heures de macération, versez-les dans l'appareil à déplacement. Ajoutez peu à peu de l'alcool dilué, jusqu'à ce que vous ayez retiré 2,000 grammes de liquide, faites évaporer au bain-marie en consistance convenable.

Dose : de 60 centigr. à 2 grammes.

79. EXTRAIT d'aloès corrigé par l'acide sulfurique

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Extrait d'aloès, 125 grammes.
Dissolvez dans
Eau distillée, Q. S
Ajoutez goutte à goutte :
Acide sulfurique rectifié, 16 grammes.
Evaporez en masse pilulaire.

80. EXTRAIT de bois de Campêche contre la dyssenterie, la diarrhée et le choléra des enfants.

(*Pharmacopée des Etats-Unis*)

Bois de campêche râpé, 374 grammes.
Eau, 3,785 —

Faites bouillir jusqu'à réduction à 1,500 grammes, passez la liqueur tandis qu'elle est chaude, faites évaporer en consistance convenable.

Dose de 1 gramme à 1 gramme 50 centigr

81. **EXTRAIT** de café

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Grains de café torréfiée et moulue, Q. V

Passez le tout comme du café ordinaire, aussi longtemps que les liquides sont colorés. Evaporez lentement la liqueur limpide, en agitant continuellement jusqu'à consistance d'extrait mou.

82 **EXTRAIT** de chanvre indien

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Sommites de chanvre
indien (Gunjah), 2 kilogr. 625 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 9 litres.

Mêlez, laissez digérer pendant sept jours, faites un extrait, et faites digérer de nouveau le chanvre avec 4 litres ½ d'esprit-de-vin rectifié pendant quatre jours ; mêlez cette teinture à l'extrait obtenu précédemment, et filtrez. Faites de nouveau bouillir le chanvre avec 9 litres d'alcool pendant un quart d'heure, et filtrez la liqueur bouillante. Réunissez toutes les teintures, et après avoir distillé l'alcool, faites un extrait au bain marie

83. **EXTRAIT** de cubebe.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Cubèbe contuse, 2,000 grammes.
Eau commune, 13 000 —

Faites-la distiller dans des appareils en cuivre étamé. Recueillez les 6 premiers kilogrammes passés dans le récipient, et séparez S. A. l'huile essentielle de l'eau. L'eau séparée est ajoutée au résidu de cubèbe de l'appareil, et distillée de nouveau pour recueillir toute l'huile. Traitez le résidu, bien exprimé, avec

Esprit-de-vin rectifié, 4,000 grammes

Faites digérer pendant vingt trois heures, l'esprit étant décanté, répétez la digestion avec une quantité égale d'alcool. Après expression et filtration des liquides, soumettez à la distillation jusqu'à ce qu'il reste un sixième du liquide Ajoutez cette solution à l'extrait aqueux, distillez et évaporez le résidu au bain de vapeur; lorsque l'extrait est refroidi, ajoutez et incorporez l'huile de cubèbe obtenue, 125 grammes.

84 **EXTRAIT** de daphne mezereum.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Ecorce de garou, 500 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 2,000 —

Faites digérer pendant trois jours; exprimez, et faites digérer de nouveau avec la même quantité d'esprit-de-vin. Filtrez les liqueurs, distillez jusqu'à ce qu'il reste un sixième des liquides, évaporez ensuite au bain de vapeur, jusqu'à consistance d'extrait

Conservez dans des vases bien bouchés

85. **EXTRAIT** d'écorce de racines de grenadier.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Ecorce de racines de grenadier pulvérisée, Q. V.
Alcool pour recouvrir les écorces, Q. S.

Laisser digérer pendant quelques jours.

Recueillez le liquide en exprimant fortement ; distillez l'alcool, et évaporez le résidu au bain-marie.

86. EXTRAIT éthéré d'écorce de racines de grenadier.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Se prépare en traitant les écorces par l'éther sulfurique et en faisant évaporer l'éther.

87. EXTRAIT de semences de datura stramonium.

(*Pharmacopée des Etats-Unis.*)

Semences de datura stramonium en poudre, 374 grammes.
Alcool dilué, Q. S.

Broyez la poudre avec 250 grammes d'alcool dilué ; introduisez le mélange dans l'appareil à déplacement, et versez dessus, peu à peu, l'alcool dilué jusqu'à ce que le liquide passe inco-

lore. Distillez pour retirer l'alcool, et faites évaporer en consistance convenable.

Dose : de 1 à 2 centigrammes. Augmenter graduellement.

88. EXTRAIT des feuilles de datura stramonium.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Feuilles de datura stramonium, 500 grammes.

Broyez-les dans un mortier de pierre ; versez dessus un peu d'eau, exprimez le suc, et après l'avoir fait bouillir, passez et évaporez jusqu'à consistance convenable.

89. EXTRAIT de laitue cultivée.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Feuilles récentes de laitue, Q. V.

Écrasez dans un mortier de marbre, en y ajoutant un peu d'eau, exprimez alors le suc, évaporez en consistance d'extrait.

90. EXTRAIT liquide de séné, purgatif tonique contre la dyspepsie.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Séné en poudre grossière,	1,000	grammes.
Sucre,	600	—
Esprit-de-fenouil,	4	—
— d'éther composé,	6	—
Alcool dilué,	2,000	—

Mêlez le séné avec l'alcool dilué, et laissez en contact vingt-quatre heures. Introduisez le mélange dans un appareil à déplacement, et versez, peu à peu, de l'eau mêlée d'un tiers en poids d'alcool, jusqu'à ce que vous ayez retiré 750 grammes de liquide. Faites évaporer, au bain-marie, jusqu'à réduction à 500 grammes. Filtrez ; ajoutez le sucre, et la solution opérée, ajoutez l'esprit d'éther composé, tenant l'essence de fenouil en dissolution.

La dose se prend de 4 à 8 grammes, dans une potion appropriée.

Le café couvrant très bien la saveur amère du séné, on rendrait la préparation plus agréable en faisant intervenir cette substance.

91. EXTRAIT de noix vomique.

(*Formule de Rodamacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Noix vomique râpée, 500 grammes.

Faites bouillir pendant une demi-heure avec :

Eau, 1,500 grammes.

Exprimez fortement et répétez deux fois cette opération.

Les liqueurs étant clarifiées, évaporez S. A. en consistance d'extrait.

92. EXTRAIT de nicotiane rustique.

(*Formule de Rodamacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Feuilles de nicotiane rustique récentes.

Exprimez le suc et évaporez S. A. à consistance d'extrait.

93. EXTRAIT d'opium sans narcotine.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Extrait aqueux d'opium, Q. V.

Dissolvez-le dans une quantité suffisante d'eau (demi environ de son poids) pour l'amener en consistance sirupeuse ; renfermez dans un flacon bien bouché, mêlez avec huit fois son volume de naphte vitriolé (1), agitez fortement pendant deux jours. Séparez le naphte surnageant, ajoutez une égale quantité de naphte, secouez bien et répétez cette opération une troisième fois jusqu'à ce que le naphte en s'évaporant ne laisse pas de résidu. Évaporez alors l'extrait sirupeux privé de narcotine, dans un bain-marie, en masse de consistance pilulaire.

94. EXTRAIT liquide de spigélie et de séné, vermifuge pour les enfants de un à cinq ans.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Spigélie en poudre grossière,	374	grammes.
Séné en poudre grossière,	180	—
Sucre,	550	—
Carbonate de potasse,	24	—
Huile essentielle de carvi,	1 gr. 50	centig.
Huile essentielle d'anis,	1 — 50	—
Alcool dilué,	Q. S.	

Mêlez la spigélie et le séné avec 1 litre d'alcool dilué, faites macérer pendant quarante-huit heures, jetez ce mélange dans un appareil à déplacement. Versez peu à peu de l'alcool dilué pour obtenir 1,500 grammes de liquide qu'on réduit à 500 grammes à l'aide d'un bain-marie. On ajoute le carbonate de potasse, et après que le sédiment a été dissous on ajoute le sucre trituré avec les huiles essentielles. On dissout enfin le sucre à une douce chaleur. La dose est d'une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

95. EXTRAIT de taraxacum.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Pissenlit recueilli au mois de septembre, 2 kil.

Coupez le pissenlit en morceaux, broyez-le dans un mortier en pierre, ajoutez un peu d'eau et réduisez-le en pulpe. Exprimez le suc et

(1) Éther sulfurique.

passez, faites évaporer dans le vide ou dans un vase plat, au bain-marie, en remuant continuellement.

Dose de 50 centigrammes à 2 grammes. Tonique diurétique et léger apéritif. Employé surtout dans les maladies chroniques du foie et dans les affections qui s'accompagnent d'un dérangement dans la sécrétion biliaire.

GÉLATINES.

96. **GÉLATINE** de lichen carragahen.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Lichen carragahen, 16 grammes.

Faites bouillir avec eau de fontaine pour obtenir une colature de 205 grammes.

Ajoutez :

Sucre blanc pulvérisé, 48 grammes.

97. **GÉLATINE** de lichen d'Islande avec sirop d'écorces d'oranges.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Gélatine de lichen d'Islande, 156 grammes.
Sirop d'écorces d'oranges, 32 —
Mêlez.

HUILES.

98. **HUILE** anthelminthique.

(*Formule de Chabert. — Pharmac. hanovrienne.*)

Huile de corne de cerf fétide, 32 grammes.
Huile de térébenthine, 96 —

Distillez pour obtenir 96 grammes de produit.

IODURES.

99. **IODURE** de fer sucré.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Limaille de fer, 4 grammes.
Ajoutez eau distillée, 62 —

Ajoutez ensuite peu à peu, en exposant à une douce chaleur :

Iode, 16 grammes.

Agitez de temps en temps jusqu'à ce que la couleur fauve soit devenue verte. Filtrez alors très vite, lavez le filtre avec un peu d'eau distillée et ajoutez à la liqueur obtenue :

Sucre de lait pulvérisé, 48 grammes.

Evaporez en une masse dure au bain de vapeur. Ajoutez :

Sucre de lait, 32 grammes.

Réduisez en poudre.

Conservez en vase parfaitement clos : poudre jaune, blanchâtre, soluble dans 7 parties d'eau. 6 grammes de cette poudre contiennent 5 centigrammes d'iode.

100. **IODURE** d'arsenic.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Arsenic, 1 partie.
Iode, 5 —

Mêlez et sublimez.

101. **IODURE** de plomb.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Limaille de fer, 32 grammes.
Eau distillée, 500 —
Iode, 125 —

Mêlez, et après la combinaison faite, filtrez à une douce chaleur et ajoutez peu à peu une solution de sel de saturne acidulée par quelques gouttes d'acide acétique concentré, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. Recueillez sur un filtre, lavez et séchez, conservez.

INFUSIONS.

102. **INFUSION** d'arnica contre les catarrhes pulmonaires chroniques des vieillards, et dans la paralysie des membres.

(*Pharmacopée de Madrid.*)

Feuilles et fleurs d'arnica montana, de chaque, 4 grammes.
Eau commune, 750 —
Sirop de citron, 60 —

A prendre en quatre doses, à intervalles convenables.

103. **INFUSION** de buchu (*infusum diosmæ*) contre les maladies chroniques urinaires.

(*Pharmacopée des Etats-Unis.*)

Feuilles de buchu, 30 grammes.
Eau bouillante, 500 —

Faites digérer deux heures, en vase clos, et passez.

Dose de 30 à 40 grammes par jour.

104. **INFUSION** de cachou composée en potion ou en lavement, comme astringent.

(*Pharmacopée des Etats-Unis.*)

Cachou en poudre, 15 grammes.
Cannelle concassée, 4 —
Eau bouillante, 500 —

Faites macérer une heure, à vase clos, et

passez. La dose est de 30 à 60 grammes, soit comme potion appropriée, ou en lavement.

105. INFUSION de digitale composée, diurétique et tonique, contre les maladies du cœur, les hydropisies, etc.

(Pharmacopée des États-Unis.)

Digitale (feuilles),	4	grammes.
Eau bouillante,	250	—
Teinture de cannelle,	24	—

Faites macérer la digitale dans l'eau pendant deux heures, en vase clos, et passez, ajoutez la teinture de cannelle. Dose de 15 à 60 grammes, trois fois par jour.

106. INFUSION de lin composée.

(Pharmacopée des États-Unis.)

Graine de lin,	15	grammes.
Réglisse en morceaux,	8	—
Eau bouillante,	500	—

Faites macérer deux heures, en vase clos, et passez.

Tisane émolliente, d'un emploi général.

L'addition d'une petite quantité de miel la rend plus agréable.

107. INFUSION de prunier de Virginie contre la phthisie pulmonaire, l'hystérie, les maladies du cœur.

(Pharmacopée des États-Unis.)

Écorce de prunier de virginie concassée,	15	grammes.
Eau,	500	—

Faire macérer vingt-quatre heures à froid et passer.

INJECTIONS.

108. INJECTION iodée contre l'hydropisie enkistée de l'ovaire.

(Formule de M. Bonnet.)

Lorsqu'un kyste est uniloculaire, qu'il est rempli d'un liquide limpide, citrin, s'écoulant avec facilité, quels que soient d'ailleurs son volume et la quantité du liquide qu'il contient, on doit, si les femmes ont bonne constitution, pratiquer d'abord une ponction, puis immédiatement une injection iodée avec le liquide suivant :

Eau distillée,	100	grammes.
Teinture alcoolique d'iode,	100	—
Iodure de potassium,	4	—

F. S. A.

LACTARIUM.

109. LACTUCARIUM allemand.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Très semblable, par la forme, l'odeur et la saveur au lactucarium anglais, mais moins brun. Extrait, comme le précédent, surtout à Pfalza, de la laitue vireuse.

110. LACTUCARIUM anglais.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Extrait sec, retiré en Angleterre du suc de la laitue cultivée, vraisemblablement aussi de la laitue vireuse, par l'évaporation du suc s'écoulant des incisions faites à la tige.

Masse sèche, d'un fauve brun, d'une odeur narcotique papavéracée, un peu soluble dans l'eau.

111. LACTUCARIUM français (*tridace*).

(Pharmacopée hanovrienne.)

Très-semblable au précédent, mais d'une odeur et d'une saveur moins narcotiques, se prépare en France par l'évaporation du suc exprimé de l'écorce de la laitue cultivée.

Ce produit s'obtient aussi, en très-grande quantité, en Auvergne, de la récolte du suc qui découle des incisions du lactuca altissima, faisant dessécher ce suc.

LAVEMENTS.

112. LAVEMENT de feuilles de frêne contre la goutte et le rhumatisme.

(Formule de M. Larue.)

Feuilles de frêne séchées convenablement,	20	grammes.
Eau,	200	—

Faites une décoction.

Fractionnez et administrez deux ou trois fois par jour.

On peut également appliquer cette préparation pendant plusieurs heures, à l'aide de compresses posées sur les points douloureux et même sur tout le corps, le visage excepté.

113. LAVEMENT contre les dyssenteries, les diarrhées chroniques.

(Formule de M. Eimer.)

On connaît l'efficacité des lavements à l'azotate d'argent contre les dyssenteries, etc. M. Eimer assure, dans le *Henle's zeitschr.*, que les lavements iodés préparés de la manière sui-

vante possèdent une efficacité au moins aussi marquée :

Iode, de 25 à 50 centigr.
Iodure de potassium, Q. S.
pour la dissolution dans
Eau distillée, 30 à 90 grammes.

Pour un lavement que l'on renouvelle deux fois dans les vingt-quatre heures et plus rarement trois et quatre fois. S'il y a du tenesme et si le malade a peine à garder son lavement, on l'additionne de 10 à 15 gouttes de teinture d'opium, et on remplace l'eau par un véhicule mucilagineux.

LINIMENTS.

114. LINIMENT liquide au savon camphré.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Savon d'Espagne, 187 grammes.
Camphre, 64 —
Alcool, 1,000 —
Dissolvez.

115. LINIMENT de savon iodé.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Savon anglais, 48 grammes.
Esprit de vin, 125 —
Dissolvez, filtrez, mêlez à la solution chaude
Iodure de potassium, 20 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 125 —
Ajoutez ensuite :
Huile de lavande, 4 gr. 30 centigr.
Mêlez.

LIQUEURS.

116. LIQUIDE employé par M. de Rivaz dans le traitement de la gourme.

Potasse caustique, 10 grammes.
Eau distillée, 100 —

On procède à la cautérisation des plaques à l'aide de ce liquide.

117. LIQUEUR d'hydrochlorate de cuivre et d'ammoniaque.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Sulfate de cuivre pur, 4 grammes.
Eau distillée, 80 —

Dissolvez, précipitez par le carbonate de soude en dissolution, lavez le précipité, desséchez.

Dissolvez une partie de cette poudre dans :

Acide muriatique, Q. S.

Ajoutez :

Sel ammoniac, 5 parties.
Eau distillée, Q. S.

pour que le liquide pèse 70 grammes.

4 grammes renferment 5 centigrammes de muriate de cuivre.

118. LIQUEUR d'hydrochlorate de chaux

(*Formule de Rademacher — Pharmacopée hanovrienne.*)

Muriate de chaux pur, 1 partie.
Eau distillée, 2 —
Dissolvez et filtrez.

119. LIQUEUR d'acétate de cuivre.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Acétate de cuivre, 50 centigrammes.
Eau distillée, 32 grammes.
Dissolvez.

120. LIQUEUR anodine térébenthinée.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Liqueur anodine d'Hoffmann, 32 grammes.
Huile de térébenthine rectifiée, 2 gr. 60 centigr.
Mélangez.

121. LIQUEUR de nitrate de soude.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Nitrate de soude, 1 partie.
Eau distillée, 2 —
Dissolvez, filtrez.

MIXTURES.

122. MIXTURE de réglisse composée contre la bronchite chronique.

(*Formule de M. Brown.*)

Réglisse en poudre, 15 grammes
Gomme arabique en poudre, 15 —
Sucre, 15 —
Teinture camphrée d'opium, 50 —
Vin antimonial, 25 —
Esprit d'éther nitrique, 12 —
Eau. 300 —

Mêlez la poudre de réglisse, la gomme arabique et le sucre dans un mortier, ajoutez peu à peu l'eau et les autres substances. La dose est d'une cuillerée à bouche toutes les deux ou trois heures.

ONGUENTS.

123 **ONGUENT** calaminaire.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Axonge, 500 grammes.
Cire jaune, 96 —

Fondez à une douce chaleur et ajoutez :

Poudre fine de calamine, 64 grammes.
— — de bol d'arménie, 64 —
— — de litharge, 64 —
— — de céruse, 64 —

Et avant le refroidissement :

Camphre pulvérisé, 8 grammes.

124 **ONGUENT** épispastique.

(*Formule de Stromayer. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Poudre de cantharides, 4 grammes.
Cérat simple, 48 —

Mélangez.

125 **ONGUENT** iodé

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Iode avec un peu d'alcool, 1 gr. 20 centigr.
Axonge, 32 grammes.

Mêlez.

126 **ONGUENT** de thlaspi bursa pastoris

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de bourse à pasteur récente, 500 gr.
Axonge de porc, 1,000 —

Chauffez à une douce chaleur et exprimez.

OXYDES.

127 **OXYDE** de zinc et selin des marais (*selinum palustre*, *peucedanum sylvestre*) employés contre l'épilepsie.

(*Traitement de M. Herpin.*)

M. Herpin prescrit, chez l'adulte :

Oxyde de zinc, 3 grammes.
Sucre, 4 —

A partager en vingt doses, trois par jour, une heure après chaque repas, ou 45 centigrammes par jour approximativement. Pour peu que le remède soit bien supporté, surtout si les malaises ont cessé dans les derniers jours de la semaine, à la seconde prescription, la dose hebdomadaire d'oxyde est augmentée d'1 gramme, même quantité de sucre, même division, même administration. M. Herpin continue chaque semaine à augmenter ainsi d'un gramme jusqu'à ce qu'il ait atteint la dose hebdomadaire de 15 grammes (2,15 par jour), ce qui arrive, si la progression a été régulière, à la treizième semaine, c'est-à-dire au bout de trois mois. En suivant cette marche, le malade emploie 52 grammes en huit semaines et 132 grammes en quatorze semaines. En persévérant à la même dose de 15 grammes pendant trois mois encore, M. Herpin a administré en six mois et une semaine 325 grammes de médicament.

Chez les enfants, comme on le comprend, la dose est réduite suivant les âges, ainsi, de la naissance à un an, la première dose hebdomadaire est de 25 centigrammes (3 1/2 centigrammes par jour). Il augmente de 25 centigrammes par semaine, et arrive ainsi, en s'arrêtant à 3,50 comme dose hebdomadaire maximum, à avoir employé 5,25 en six semaines, 24 en trois mois et 68 en six mois. A dix ans, il commence par 50 centigrammes (7 par jour), et il n'augmente que de 1/2 gramme la première semaine, puis de 1 gramme comme dans les périodes précédentes. De dix à quinze ans, début par la dose hebdomadaire de 1 gramme (15 centigrammes par jour), et l'on peut, sans inconvénient, augmenter de 1 gramme par semaine.

L'apparition de quelques malaises, au début, ne doit pas empêcher de persévérer, s'ils ne sont pas trop incommodes. Dans le cas contraire, on supprime la dose du matin. Si les malaises persistent encore à la fin de la semaine, on continue sans augmentation la semaine suivante. Mais il est bien rare, soit à cette époque, soit plus tard, qu'il soit nécessaire de donner la même dose plus de deux semaines de suite. Dans les cas rares où l'on a quelque peine, en raison des effets physiologiques du remède, à vaincre la répugnance du malade, il faut administrer le zinc en pilules. Sous cette forme, à dose égale, il produit moins facilement de nausées. On peut encore, pour faciliter la tolérance, employer comme excipient l'extrait de valériane. Enfin, dans les cas de grande répugnance ou de profond dégoût, on peut ajouter à la masse pulvérulente quelques centigrammes de cannelle ou de toute autre substance aromatique.

Relativement au selin des marais, *selinum palustre, peucedanum sylvestre* (Ombellifères), c'est la poudre de la racine qui est donnée dans les cas de ce genre, en débutant par 2 ou 4 grammes, en 2, 3 ou 4 prises, et en arrivant à 15, même 30 grammes, si la tolérance s'obtient facilement, ce qui a lieu le plus habituellement. Il faut, comme pour l'oxyde de zinc, continuer le traitement assez longtemps après la suspension des accidents; d'après M. Herpin, il faudrait aller au-delà de 500 grammes avant de cesser le traitement.

128. **OXYDE** d'argent.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Nitrate d'argent, 8 grammes.
Eau distillée, 125 —

Dissolvez et ajoutez une dissolution de potasse caustique pure, jusqu'à ce que la liqueur soit légèrement alcaline, filtrez, et recueillez le précipité qui se présente sous forme d'une poudre noire, pesante.

PASTILLES.

129. **PASTILLES** de chocolat au citrate de magnésie.

(*Formule de M. Langlois.*)

Chocolat simple, 500 grammes.
Citrate de magnésie, 500 —

Mêlez exactement, et divisez en pastilles hémisphériques du poids de 1 gramme chaque.

Ce chocolat peut être pris sans être divisé, les pastilles contiennent 50 centigrammes de citrate.

130. **PASTILLES** de chocolat au tartrate de magnésie.

Chocolat simple, 500 grammes.
Tartrate de magnésie, 500 —

Mêlez et conservez en masse, ou divisez en pastilles de 1 gramme, qui contiennent 50 centigrammes de tartrate.

131. **PASTILLES** nutritives des convalescents et des voyageurs.

(*Formule de M. Cadet-Gassicourt.*)

Cuisse de bœuf dégraissée, 6 kilogrammes.
Pieds de veau,
Carottes, navets, poireaux, céleri, } ãã Une forte botte.
Oignons brûlés,
Clous de girofle,
Gomme arabique, 500 grammes.

Hachez la chair musculaire, triturez-la dans un mortier de marbre, avec Q. S. d'eau, et exprimez; répétez ce traitement jusqu'à ce que la viande soit épuisée, soumettez le résidu à la presse. Faites bouillir un instant les liquides réunis; passez-les à travers une étamine, évaporez la colature au bain-marie, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à 1/2 litre environ.

Lavez et coupez les légumes et les pieds de veau, mettez ces substances dans une marmite autoclave, avec les oignons et les clous de girofle, et ajoutez de l'eau de rivière pour immerger le tout; faites bouillir sur un feu doux; laissez un peu refroidir avant d'ouvrir l'autoclave; passez le décocté; achevez de le laisser refroidir, dégraissez-le, remettez-le sur le feu pour le clarifier avec deux blancs d'œufs battus; passez, évaporez la colature au bain-marie.

Versez la solution gommeuse dans le bouillon de légumes et de pieds de veau, évaporez aux 3/4, et continuez l'évaporation. Ajoutez le 1/2 litre du premier produit mis de côté, accomplissez le mélange en continuant d'évaporer un peu, coulez dans des moules S. l'A. Faites réduire à une douce température, en tablettes, dont vous faites des pastilles à l'emporte-pièce.

Chaque pastille, du poids moyen de 75 centigrammes, contient les sucs de 5 grammes de chair musculaire et d'autant de légumes environ.

PHOSPHATES.

132. **PHOSPHATE** de chaux.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Phosphate de soude, 62 gr. 50 centigr.

Dissolvez dans :

Eau distillée, 1,000 grammes.

Ajoutez peu à peu une dissolution de chlorure de calcium, de manière à laisser prédominer le phosphate de soude. Lavez le précipité gélatineux, desséchez à une douce chaleur et réduisez en poudre qui doit être blanche, insipide et ne pas contenir d'hydrochlorate de chaux.

133. **PHOSPHATE** de fer.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Sulfate de fer cristallisé pur, 96 grammes.
Dissolvez dans eau distillée six fois autant.
Ajoutez à la solution :

Phosphate de soude, 250 grammes,

dissous dans l'eau distillée. — Lavez bien le précipité, desséchez-le et conservez. Poudre très-fine, d'un bleu sale, insoluble à une douce chaleur dans les acides nitrique et chlorhydrique.

PILULES.

134. **PILULES** antimoniales contre les affections psoriques.

(*Formule de M. Bouchardat.*)

Sulfure d'antimoine porphyrisé, 40 gramm
Cannelle, 5 —
Conserve de roses, Q. S.

F. S. A. des bols de 0,4. Dose, 2 à 4 par jour.

135. MASSE de pilules balsamiques.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Extrait de chardon bénit,	24	grammes.
— de fumeterre,	24	—
— d'absinthe,	24	—
— d'aloès,	16	—
— de myrrhe,	16	—
— de gomme mastic,	8	—
— de sandaraque,	8	—

M. F. masse pilulaire.

136. PILULES au chlorure de barium contre la syphilis et les maladies scrofuleuses.

(*Formule de M. Foy.*)

Chlorure de barium, 60 centigrammes.
Faites dissoudre dans :

Eau distillée,	2 grammes.
Gentiane en poudre,	7 —
Gomme arabique en poudre,	2 —
Sirop simple,	Q. S.

Faire 96 pilules. La dose est de 1 à 5 pilules, et s'il est nécessaire au delà.

137. PILULES contre les névralgies de la cinquième paire.

(*Formule de M. Tourmé.*)

Valérianate de zinc,	30 centigrammes.
Extrait de jusquiame,	15 —
Extrait d'opium,	8 —
Conserve de roses,	Q. S.

Mêlez. Faites 6 pilules. A prendre 2 ou 3 par jour à trois heures d'intervalle.

138. PILULES cathartiques composées, purgatif très actif contre les hydropisies et les maladies du cœur.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Extrait composé de coloquinte en poudre,	15 grammes.
Extrait de jalap,	12 —
Calomel,	12 —
Gomme gutte en poudre,	2 gr. 50 centigr.

Mêlez avec de l'eau et faites une masse que l'on divise en 180 pilules. La dose est de 2 à 4.

139. PILULES bleues contre la cirrhose du foie.

(*Formule de M. Monneret.*)

Mercure métallique éteint à parties égales dans la conserve de roses.

F. S. A. des pilules de 5 à 10 centigrammes.

La dose est de 1 à 5 par jour, soit 20 ou 25 centigrammes.

M. Monneret associe à ce médicament l'eau de Vichy, les bains alcalins ou sulfureux, il prescrit aux malades l'usage des aliments azotés, du vin auquel il joint les amers et les ferrugineux.

140. PILULES asiatiques contre les maladies de la peau et du psoriasis.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Acide arsénieux,	5 centigrammes.
Poivre noir,	60 —
Gomme arabique,	1 —
Eau,	Q. S.

Triturez pour faire 12 pilules à prendre 1 par jour. Cette préparation est très-active, on peut varier la dose de 1 à 2.

Autre formule analogue, mais plus faible.

Masse de pilules asiatiques,	50 centigramm.
Extrait de taraxacum,	1 gr. 50 centigr.

Mêlez pour faire 20 pilules. Dose, 1 à 2 par jour.

141. PILULES de cynoglosse.

(*Formule de M. Lecomte.*)

Ecorce de racine de cynoglosse,	60 gramm.
Semences de jusquiame,	15 —
Extrait aqueux d'opium,	15 —
Myrrhe,	6 —
Safran,	6 —
Castoreum,	6 —
Sirop simple,	Q. S.

142. PILULES de chlorure de zinc contre le cancer du nez.

Chlorure de zinc,	1 gr. 50 centigr.
Extrait de ciguë récente,	75 centigrammes.
Résine de gayac,	10 grammes.
Extrait de chardon bénit,	6 —

F. S. A. 90 pilules, on en prend 3 par jour.

Une femme de quarante-trois ans, qui portait, depuis plusieurs mois, sur le côté gauche de la pointe du nez, une petite tumeur percée à son centre, et qui fournissait une matière ichoreuse jaune brunâtre, cette tumeur fut cautérisée avec le chlorure de zinc dissous dans partie égale de son poids d'eau, et la malade prit les pilules, elle suivit la diète végétale, et prit l'eau froide pour boisson, la tumeur finit par tomber, se guérir, plus tard elle se reproduisit, M. Verheech la détruisit en dix jours, on continua de toucher, la plaie restée mince, se cicatrisa, la guérison date de sept ans.

Le chlorure de zinc ne produit pas d'accidents à l'intérieur ni à l'extérieur. Son effet le plus apparent est celui d'augmenter la sécré-

tion urinaire. On peut le pousser jusqu'à 40 centigrammes par jour. A l'extérieur à faible dose il est calmant, résolutif et excitant; très-concentré, c'est un caustique énergique.

143. PILULES avec l'émétique contre la pneumonie.

(*Formule de feu le docteur Ernest Boudet.*)

Émétique,	3 gr. 20 centigr.
Extrait d'opium,	16 centigrammes.
— de laitue,	4 grammes.
Gomme arabique,	1 gr. 50 centigr.
Poudre de guimauve,	1 — 50 —

Pour 32 pilules, chacune de 0,1 gramme d'émétique.

On commence par donner 2 à 3 de ces pilules, de deux en deux heures *et en les faisant suivre de l'ingestion d'un demi-verre de tisane*, on arrive promptement (dès le lendemain) à la dose de 5 ou 6 pilules aux mêmes intervalles, on obtient ainsi, le plus souvent, la cessation des vomissements et des selles liquides qui avaient lieu les premiers jours. Quand on s'en tient, pendant toute la durée du traitement, à 2 ou 3 pilules toutes les deux heures, il y a généralement un ou deux vomissements et une ou deux selles par vingt-quatre heures, la tolérance n'est pas complète.

144. PILULES iodo-argentiques contre la syphilis.

(*Formule de M. Mialhe.*)

Azotate d'argent,	1 gramme.
Iodure de potassium,	2 —
Amidon,	3 —
Gomme arabique,	1 —
Eau,	Q. S.

Faites 100 pilules. Dose, 1 à 5.

145. PILULES d'iodure d'argent contre la syphilis et le lupus.

(*Formule de Patterson.*)

Iodure d'argent,	20 centigrammes.
Conserves de roses,	Q. S.

Faites 20 pilules. Dose, de 1 à 6.

146. PILULES d'oxyde d'argent contre la métrorrhagie.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Nitrate d'argent,	125 grammes.
Eau distillée,	150 —
Solution de potasse,	750 — ou Q. S.

Dissolvez le nitrate d'argent dans l'eau, ajoutez à la solution de la solution de potasse tant qu'elle produit un précipité. Lavez le précipité à plusieurs reprises jusqu'à ce que la liqueur de lavage n'ait presque plus de goût. Faites sécher la poudre qui reste sur le filtre et gardez à l'abri des rayons lumineux dans un flacon bien bouché.

Dose, 2 à 10 centigrammes, trois fois par jour, en pilules.

147. PILULES stibiées contre les maladies cutanées.

Antimoine cru porphyrisé,	de chaque parties égales.
Extrait de douce amère,	

Faites des pilules de 10 centigrammes. Dose, de 5 à 10, trois fois par jour.

148. PILULES de tartre stibié contre le catarrhe chronique et la phthisie.

(*Formule de M. Bernardeau, de Tours.*)

Tartre stibié,	6 centigrammes.
Extrait de réglisse,	6 grammes.

A diviser en 25 pilules.

Dose, 3 pilules par jour, jamais plus de 6 dans la même journée. Une première administration de 25 pilules amène une amélioration notable dans l'état du malade; si on est obligé de la renouveler, il faut mettre quelques jours d'intervalle entre la première et la deuxième.

149. PILULES de vératrine contre le rhumatisme articulaire aigu.

(*Formule de M. le docteur Piédagnel.*)

Faites avec de la vératrine des pilules d'un 1/2 centigramme chacune. Le traitement se fait de la manière suivante: le premier jour, le malade doit prendre 3 pilules, 1 le matin, 1 à midi et 1 le soir; ensuite on augmente de 1 pilule chaque jour, et on va ainsi jusqu'à 10, nombre qu'il ne faut pas dépasser, c'est donc 5 centigrammes au plus qu'il faut prendre dans les vingt-quatre heures. Si le médicament produit des accidents du côté du tube digestif, tels que chaleur à la gorge et à l'estomac, vomissements, diarrhée, on le suspend pour le reprendre ensuite, et pendant cette interruption, M. Piédagnel prescrit les bains de vapeur, sans avoir jamais recours à la saignée.

POMMADES.

150. POMMADE au turbith nitreux dans le traitement de la gourme.

(*Formule de M. Mialhe.*)

Axonge,	40 grammes.
Turbith nitreux,	2 —
Extrait thébaïque,	1 —

Mêlez.

M. de Rivaz fait faire avec cette préparation deux onctions par jour aux enfants atteints de gourmes.

Cette pommade a parfaitement réussi dans les cas d'eczéma, ordinairement si tenaces, qui surviennent aux femmes à l'époque où elles cessent d'être réglées. Outre son action sur les maladies cutanées, elle tue les poux et détruit leurs lentes, ce qui est un grand mérite, lorsque l'on songe à la multitude de ces animaux qui pullulent dans les cheveux et sous les squammes des malheureux enfants; de telle sorte que les parents ne peuvent les garantir de cette vermine, et qu'elle excite une démangeaison qui vient rendre plus pénible la présence des gourmes.

151. POMMADE au goudron.

(*Formule du docteur Emery.*)

M. de Rivaz dit s'être très bien trouvé de l'emploi de la pommade suivante dans le traitement de la gourme et surtout de l'impetigo.

Goudron,	1 partie.
Axonge,	3 —

Mêlez.

152. POMMADE astringente prophylactique contre les gerçures du sein.

(*Formule de MM. Dubois et Cazeaux.*)

Ces savants médecins proposent la pommade suivante comme moyen prophylactique.

Tannin,	4 grammes.
Axonge,	30 —

Faites des frictions avec cette pommade.

Quand la femme commence à nourrir, le meilleur moyen de la préserver de ces accidents, c'est de laver le mamelon avec une éponge fine dès que l'enfant a teté. M. Trousseau a fait observer que la salive de l'enfant est acide et que, s'il reste un peu de caseum, cela suffit pour amener des excoriations.

153. POMMADE contre les gerçures du sein

Quand ces gerçures commencent à se manifester, il faut laver le mamelon avec de l'eau tiède d'abord, puis avec une légère solution de nitrate d'argent. On a bien conseillé, si ce moyen ne suffisait pas, l'emploi de la pommade suivante :

Précipité blanc,	20 centigr.
Axonge,	10 à 15 grammes.

Mais comme il pourrait résulter des accidents chez l'enfant par suite de l'absorption de la pommade mercurielle, on doit en surveiller l'usage avec le plus grand soin.

154. POMMADE d'anthrakokali contre l'eczema.

Anthracokali,	1 gramme.
Axonge,	30 —

Mêlez.

155. POMMADE de chlorure de zinc contre les engorgements scrofuleux.

(*Formule de M. Verbeeck.*)

Axonge,	180 grammes.
Chlorure de zinc,	2 gr. 50 centigr.

Contre les engorgements scrofuleux. En frictions sur les tumeurs, trois fois par jour employant 4 grammes de pommade.

Employée chez un enfant de cinq ans présentant des glandes au cou, après quatre semaines toute trace d'engorgement avait cessé. L'enfant avait été soumis à un régime approprié, on suspendit les frictions à cause de l'inflammation qu'elles causaient.

156. POMMADE contre la gourme.

M. de Rivaz emploie des pommades préparées selon les formules de M. Cazenave, qui sont les suivantes :

Sous-carbonate de potasse,	2 grammes.
Cérat de Galien,	30 —

F. S. A.

Cyanure de mercure,	50 centigr.
Axonge,	30 grammes.

Mêlez.

157. POMMADE mercurielle composée contre la syphilis.

Onguent napolitain,	30 grammes.
Chaux éteinte,	8 —
Sel ammoniac,	4 —
Soufre,	4 —

Cette pommade, employée à l'hôpital de Toulon, a l'avantage de moins tacher le linge et ne provoque point la salivation.

158. POMMADE contre les migraines et les névralgies faciales.

(*Formule du docteur Cazenave.*)

Chloroforme pur,	12 grammes.
Cyanure de potassium,	10 —
Axonge récente,	60 —
Cire,	Q. S.

pour obtenir la consistance d'une pommade.

Il faut prendre le soir, en se couchant, gros de la pommade comme deux œufs de pigeon, l'étendre sur la paume des mains et en enduire les cheveux en tous sens. Dès que cette opération, qui doit être prompte, est terminée,

on couvre la tête avec un bonnet en taffetas ciré et à coulisse, afin d'éviter la volatilisation du chloroforme. En opérant de la sorte, les cheveux et le cuir chevelu sont enduits de pommade pendant douze heures.

159. **POMMADE** urticante.

(*Formule de M. Blatin.*)

Cette pommade qu'il propose, comme pouvant être substituée aux pommades d'autenrieth et à l'huile de croton tiglium, se prépare de la manière suivante :

Axonge,	30 grammes.
Soies épineuses du pois à gratter (dolichos pruriens),	50 centigr.

Mêlez exactement.

Selon M. Blatin, l'action de cette pommade est immédiate, elle produit une sensation analogue à celle qu'excite le contact des orties. Le malade est obligé de frictionner pendant dix, quinze à vingt minutes la partie que le médicament a touchée. Pendant la friction, la chaleur brûlante et le prurit s'apaisent et disparaissent complètement en moins d'une demi-heure. La peau se couvre ordinairement de papules blanches et plates qui ne tardent pas à s'effacer, elle devient le siége d'une chaleur incommode. L'urtication produite par les soies épineuses du dolichos pruriens n'est due qu'à l'introduction de ces soies dans nos tissus. Des essais variés ont démontré qu'elle ne dépendait d'aucune matière soluble de nature irritante. La dose de pommade à employer pour chaque friction est de 50 à 60 centigrammes. M. Blatin pense qu'en associant à la pommade diverses substances médicamenteuses et entre autres des sels solubles, de l'hydrochlorate de morphine, de strychnine, on les fera facilement pénétrer dans le tissu de la peau, comme s'ils avaient été inoculés avec une aiguille ou une lancette. La médication sous-endermique, désormais exempte des inconvénients qui la font trop négligée prendrait dès lors une large part dans la thérapeutique.

POTIONS.

160. **POTION** antitétanique.

(*Pharmacopée de Madrid.*)

Infusion très-concentrée de fleurs d'arnica,	100 grammes.
Eau distillée de mélisse officinale,	60 —
Musc,	60 centigr.
Camphre,	4 grammes.

Ajoutez, suivant l'état des organes urinaires :
Nitrate de potasse, 2,50, 3,50 ou 5 grammes.

Le camphre est pulvérisé avec quelques gouttes d'alcool, on ajoute le musc et un peu de mucilage de gomme arabique, puis on fait dissoudre dans les liquides ces substances et le nitrate de potasse.

Dose : une cuillerée à bouche toutes les heures. Elle est donnée dans certains cas d'asthme et dans les affections nerveuses, particulièrement dans celles qui affectent la forme convulsive.

161. **POTION** contre la dyssenterie.

(*Formule de M. Haspel.*)

Calomel,	1 à 2 grammes.
Ipecacuanha en poudre,	5 decigr. à 2 gr.
Laudanum,	10 à 12 gouttes.
Véhicule quelconque,	120 grammes.

F. S. A. Avant de donner au malade de cette potion, on agitera vivement la fiole.

POUDRES.

162. **POUDRE** antispasmodique rouge.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Sulfure de potassium pulvérisé,	125 grammes.
Nitrate de potasse,	125 —
Cinabre précipité,	32 —

163. **POUDRE** anti-épileptique.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Racine de pivoine,	32 grammes.
Corne de cerf,	32 —
Guy de chêne,	32 —
Corail rouge,	8 —
— blanc,	8 —
Magnésie,	8 —

F. poudre et ajoutez :
Feuilles d'or diviséss, N° 6.

164. **POUDRE** d'antimoine composée.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Antimoine cru,	16 grammes.
Magnésie calcinée,	12 —
Écorce d'orange,	4 —

Mêlez.

165. **POUDRE** d'anthrakokali (*carbure de potassium*) contre les maladies cutanées.

Anthracokali,	0,1
Réglisse en poudre,	0,3

A prendre en poudre une dose que l'on répète trois ou quatre fois par jour.

D'après Jourdan, ce remède provoque d'abondantes sueurs.

166. POUDRE antiseptique pour saupoudrer les ulcères rebelles et gangréneux

(Pharmacopée de Madrid.)

Poudre de racine d'arnica,	} ãã parties égales.
Bisulfate de quinine,	
Camphre,	

Mêlez exactement.

167. POUDRE d'aloès et de cannelle, purgatif stimulant contre la chlorose.

(Pharmacopée des États-Unis.)

Aloès,	374 grammes.
Cannelle,	90 —

Réduisez chacune de ces substances en poudre fine, séparément, puis mêlez.

La dose est de 50 centigrammes à 1 gramme 25 centigrammes.

168. POUDRE contre l'érysipèle.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Farine de froment,	187 grammes.
Litharge,	64 —
Bol rouge,	64 —
Mastic,	64 —
Oliban,	32 —
Céruse,	32 —

M. F. Poudre très fine.

169. POUDRE gazeuse.

(Formule de Vogler. — Pharmac. hanovrienne.)

Carbonate de soude sec,	8 grammes.
Crème de tartre,	24 —
Sucre blanc,	16 —

Mêlez.

170. POUDRE stomachique.

(Formule de Serturner. — Pharmacopée hanovrienne.)

Yeux d'écrevisses pulvérisés,	24 grammes.
Magnésie calcinée,	8 —
Muriate de soude,	16 —
Carvi,	16 —
Poudre aromatique,	8 —
— d'althea,	16 —

Mélangez.

171. POUDRE contre l'amaurose.

(Pharmacopée de Madrid.)

Fleurs d'arnica,	2 grammes	50 centigr.
Racine de valériane,	2 —	50 —
Gomme ammoniaque,	2 —	50 —

Réduisez en poudre, et ajoutez :

Tartre stibié,	5 centigrammes.

Divisez en trois doses, à prendre dans les vingt-quatre heures. Si on le préfère, la poudre peut être réduite en pilules à l'aide d'un excipient convenable.

PRÉPARATIONS.

172. PRÉPARATIONS de glycérine contre les excoriations et gerçures du sein.

(Formule de M. Startin, de Londres.)

M. Startin (de Londres) a préconisé contre les excoriations et les gerçures du mamelon des préparations dont la glycérine, ou principe doux des huiles, fait la base. En voici les principales formules :

Gomme adragante pure,	8 à 15 grammes.
Eau de chaux,	120 —
Eau distillée de rose,	100 —
Glycérine purifiée,	30 —

M. S. A. Faire une gelée molle qu'on peut employer en onctions ou embrocations.

Il se sert du liquide suivant contre les fissures du mamelon :

Biborate de soude,	2 à 4 grammes.
Glycérine purifiée,	15 —
Eau distillée de rose,	225 —

Tous ces moyens sont favorisés par l'emploi des bouts de sein artificiels.

173. PRÉPARATIONS d'iode contre les scrofules, les syphilis anciennes, les tumeurs blanches.

(Formule de M. le docteur Burggraeve.)

Dans la *syphilis invétérée* :

Iodure potassique,	100 grammes.
Eau de fleurs d'oranger,	1 kilogr.
Iode,	1 gramme.
Iodhydrargyrate de potasse,	1 —

Dose : d'abord un verre à liqueur, puis un verre matin et soir, jusqu'à disparition des symptômes. Le régime doit consister en viandes succulentes et en boissons toniques.

Dans les *scrofules*, *goître*, *phthisie au début*, *rachitis*, etc. :

Iodure de barium,	6 grammes.
Poudre de canelle,	5 —
— de sucre,	5 —

Faites 8 paquets. A prendre 2 ou 3 par jour.

Faire usage, en outre, de l'iodure de barium en friction ou en topique sur les ulcères :

Iodure de barium,	2 à 4 décigr.
Axonge,	30 grammes.

Dans la *cachexie cancéreuse*, en vue d'obtenir la résolution des engorgements :

Savon médicinal,	8 grammes.
Gomme ammoniaque,	4 —
Iodure de fer,	2 —
Poudre d'herbe de ciguë,	2 —
— d'aconit,	2 —

Faites des pilules de 20 centigrammes.

Dose 2 pilules matin et soir

Pommade contre les douleurs lancinantes

Iodure de potassium,	3 grammes.
Iodhydrate de morphine,	1 gramme.
Axonge,	40 grammes.

Frictions matin et soir pendant un quart d'heure.

Dans les *affections dartreuses :*

Iodure de soufre, 2 grammes.
Mucilage de gomme arabique, de quoi faire 36 pilules

Chez les adultes, d'abord 1 pilule matin et soir ; puis on augmente jusqu'à 6 pilules, selon la tolérance du sujet.

On seconde quelquefois l'action du remède interne par la pommade suivante :

Iodure de soufre,	6 décigr. à 4 grammes.
Axonge,	30 grammes.

Une friction matin et soir.

174. PRÉPARATION du tartrate ferrico-potassique en paillettes.

(*Formule de MM. Corneim et Gille, de Liége.*)

Sulfate ferreux pur et cristallisé,	1,000 gram.
Acide sulfurique à 66°,	200 —
Eau,	4,000 —

On fait dissoudre le sulfate dans l'eau, on y mêle l'acide sulfurique et l'on porte le tout à l'ébullition dans une capsule de porcelaine ou de grès. On ajoute ensuite de l'acide nitrique jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de vapeur nitreuse. Lorsque le dégagement a cessé, on étend le liquide de dix à quinze fois son poids d'eau, on le verse dans une suffisante quantité d'ammoniaque, préalablement additionnée d'environ vingt-cinq fois son volume d'eau. On lave le précipité d'hydrate ferrique jusqu'à ce que l'eau de lavage soit devenue parfaitement incolore et insipide, on le recueille sur une toile, et on le laisse égoutter jusqu'à ce qu'il soit sous forme de gelée. On met celle-ci dans un vase de grès ou de porcelaine, et l'on y ajoute 680 grammes de bi-tartrate potassique. Après avoir mêlé soigneusement, on chauffe au bain-marie, à une température de 60 à 70° centigrades, jusqu'à dissolution complète ; on livre ensuite la liqueur au repos, puis on décante dans un vase où on laisse refroidir. Il arrive parfois que par le refroidissement, la liqueur se prend en une masse jaune rougeâtre et constitue un précipité insoluble dans l'eau. Ce phénomène est dû à un excès de crème de tartre, lorsqu'il a lieu, on ajoute peu à peu de l'hydrate potassique au précipité, jusqu'à ce qu'il soit devenu entièrement soluble. On filtre la liqueur, on l'évapore à une température de 50 à 60° sur des assiettes, jusqu'à consistance de miel clair, et on l'étend avec un pinceau, en couches minces, sur des lames de verre placées horizontalement, afin que la liqueur s'étende d'une manière bien uniforme.

Dans cette préparation, on pourrait remplacer l'hydrate potassique par l'ammoniaque, mais cet alcali présente un inconvénient qui ne se rencontre pas lorsqu'on emploie l'hydrate potassique. Ainsi, lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque au précipité produit par la crème de tartre en excès, et que l'on chauffe ensuite à une température un peu élevée, l'ammoniaque se volatilise et le tartrate ferrico-potassique redevient insoluble.

REMÈDES.

175. REMÈDE contre la syphilis.

(*Formule de M. Payan.*)

Chlorure d'argent,	5 centigrammes.
Poudre d'iris de Florence,	1 décigramme.

Mêlez. Divisez en douze paquets égaux.

Frictions chaque jour sur la langue pendant un quart-d'heure avec un paquet, 1 pilule, le soir, d'un 1/2 centigramme d'oxyde d'argent. Au bout de quelques jours augmenter de 1 pilule.

SAVONS.

176. SAVON d'huile de ricin de Stümcke.

Suivant Stumcke, la saponification de l'huile de ricin par les alcalis se fait avec une grande facilité. Cette huile fournit avec la soude, entre autres, un savon blanc et dur qui, administré sous forme pilulaire constitue un remède laxatif des plus commodes.

On a déjà donné quelques formules où l'huile de ricin était mêlée à du savon ou saponifiée en partie. Ces formules sont les suivantes pour des mixtures purgatives :

1°	Huile de ricin,	190 grammes.
	Savon médicinal,	15 —
	Sirop d'écorces d'orange,	90 —

(*Pharmacopée d'Augustin.*)

2° Huile de ricin,	90	grammes
Carbonate de potasse,	4	—
Miel,	30	—
Eau de tilleul,	300	—

(*Même ouvrage.*)

3° Huile de ricin,	60	grammes.
Carbonate de potasse,	1 gr. 27	centigr.
Eau de menthe poivrée,	90	grammes.
Sirop capillaire,	15	—

(*Formulaire de Cadet.*)

177. **SAVON** mercuriel.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Onguent mercuriel,	112	gramm.
Dissolution de potasse caustique,	96	—

Mêlez intimement dans un mortier.

SIROPS.

178. **SIROP** d'ail.

(*Pharmacopée des Etats-Unis.*)

Ail frais bien nettoyé et écrasé,	180	grammes.
Acide acétique dilué,	500	—
Sucre en poudre grossière,	750	—

Faites macérer l'ail, dans un vase de verre, avec 250 grammes d'acide acétique dilué, pendant quatorze jours, et exprimez la liqueur, versez le reste d'acide sur le résidu; exprimez de nouveau jusqu'à ce que, avec les deux liqueurs réunies, vous ayez retiré une pinte de liquide; filtrez et jetez la liqueur filtrée sur le sucre renfermé dans une bouteille d'un litre, agitez jusqu'à dissolution.

Dose, de 20 à 30 grammes.

179. **SIROP** de copahu à la magnésie.

(*Formule de M. Mouchon, pharmacien à Lyon.*)

Baume de copahu pur,	125	grammes.
Magnésie calcinée,	2	—
Sirop de gomme arabique,	1,875	—
Essence de menthe poivrée,	2	—

Après avoir trituré ensemble pendant dix minutes le copahu et la magnésie, on incorpore successivement l'huile essentielle et le sirop en triturant sans interruption jusqu'à parfaite union. Douze heures après, on introduit le sirop dans les vases qui doivent le contenir.

On obtient ainsi un produit qui a l'aspect du sirop d'orgeat et qui est loin d'inspirer le dégoût qui naît infailliblement de l'usage du copahu, bien qu'il produise parfois de ces retours pénibles, de ces éructations dont on ne peut pas toujours se défendre après l'emploi de cette oléo-résine.

L'essence de menthe joue là le rôle de correctif au grand avantage du sens olfactif et des voies digestives, ce qui explique sans doute l'espèce de tolérance que montre assez souvent l'estomac pour ce sirop.

180. **SIROP** d'huile iodée.

(*Formule de M. Lacassin.*)

Huile iodée,	30	gramm.
Eau,	30	—
Sucre,	60	—
Gomme pulvérisée,	20	—
Alcoolé de citron pour aromatiser,	Q. S.	

Sa saveur se rapproche beaucoup de celle du sirop d'orgeat.

181. **SIROP** d'iodure de fer.

(*Formule de Wackenroder.*)

Limaille de fer,	4	grammes.
Eau distillée	32	—
Iode.	4	—

Après la réaction, filtrez et ajoutez:

Sucre blanc pulvérisé, 24 grammes.

Lavez le filtre avec eau distillée 48 grammes, et réduisez le tout à 60 grammes.

Conservez dans des petits flacons.

182. **SIROP** d'huile de ricin à la magnésie.

(*Formule de M. Mouchon, pharmacien à Lyon.*)

En combinant ensemble 48 grammes de sirop d'orgeat ou de sirop de lait, 16 d'huile de ricin récente et 20 centigrammes seulement de magnésie calcinée, ont peut constituer un sirop de ricin pour les enfants du premier âge et même pour ceux du second, d'autant plus qu'il est facile de le rendre plus agréable par l'addition d'une goutte d'essence de menthe, de citron, d'amandes, etc.

Il les purge assez bien à la dose de 30 ou de 60 grammes sans leur inspirer le moindre dégoût.

Il ne faut pas confondre le *sirop d'huile de ricin* avec celui *de semences* qui figure dans la monographie de M. Mouchon sous le nom de *sirop de ricin*, ce dernier étant plutôt un *émeto-cathartique* qu'un *minoratif proprement dit*, bien qu'il puisse trouver sa place parmi les évacuants intestinaux pour les personnes que la nature a douées d'une forte constitution.

183. **SIROP** pectoral.

(*Formule de Werlhof.—Pharmac. hanovrienne.*)

Sirop de pavot rouge,	250	grammes
Ether hydrochlorique.	32	—

Mêlez.

184. SIROP de pyrophosphate de fer.

(Formule de M. E. Soubeiron.)

Sulfate ferrique,	3 gr. 60 centigr.
Eau,	60 grammes.

On laisse dissoudre lentement, ce qui demande parfois deux ou trois jours, ou mieux on fait dissoudre au bain-marie, dans un matras, à une douce chaleur.

D'autre part :

Pyrophosphate de soude cristallisé,	30 grammes.
Eau pure,	220 —
Eau distillée de menthe,	100 —

On fait dissoudre à froid ou à une douce chaleur. Alors dans cette dissolution refroidie on ajoute la solution de sulfate ferrique et l'on agite. Il se fait au moment du mélange un précipité qui ne tarde pas à se redissoudre, on filtre la liqueur et l'on ajoute :

Sucre très-blanc, 590 grammes.

On fait dissoudre à froid dans un matras de verre. Il faut faire la dissolution à froid ou au moins à une température qui ne dépasse pas 50°, autrement le sirop prendrait une couleur lie de vin qui, à 70 à 80°, deviendrait très foncée.

Une cuillerée (20 grammes de ce sirop), contient 2 centigrammes de fer à l'état de pyrophosphate double.

Si l'on n'a pas de sulfate ferrique, on emploie pour la dose de sirop précédente ou 1 kilogramme de sirop,

Sulfate ferreux cristallisé,	5 grammes.
Acide sulfurique,	1 gr. 60 centigr.
Acide nitrique,	Q. S.

On met le sulfate dans une capsule avec une petite quantité d'eau et l'acide sulfurique ; on chauffe et l'on ajoute de l'acide nitrique par petites parties jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nitreuses, on évapore à siccité à une douce chaleur, le produit est le sulfate ferrique neutre. En en préparant une certaine quantité à l'avance, on évite de répéter cette opération chaque fois qu'il faut préparer du sirop.

185. SIROP de quinquina calissaya.

(Formule de M. Mathieu.)

Quinquina calisaya,	1,920
Sirop de sucre,	16,000
Gomme arabique concassée,	125

Le quinquina réduit en grosse poudre est épuisé par trois décoctions successives avec une grande quantité d'eau, 10 litres chaque fois, en prolongeant l'ébullition une forte demi-heure à chaque opération. Les décoctés passés avec soin, sont réunis et placés dans un vase cylindrique, allongé de manière à pouvoir décanter le dépôt qui se sera formé après douze heures de repos, la liqueur opaque qui en résulte est soumise à l'évaporation avec le sirop simple, en ajoutant celle-ci par parties pour interrompre l'ébullition, à la fin de la concentration, on ajoute la gomme préalablement dissoute dans une petite quantité d'eau. Lorsque le sirop marque 31° à l'aréomètre, on le passe à la chausse, le vase qui le reçoit est immédiatement fermé jusqu'à ce qu'il ne soit plus que tiède.

186 SIROP de limaçon.

(Pharmacopée hanovrienne.)

Limaçon rouge,	n° 1.
Sucre,	32 grammes.
Eau,	32 —

Faites cuire jusqu'à 32 grammes de colature.

SOLUTIONS.

187. SOLUTION de chlorure de zinc contre les affections scrofuleuses et carcinomateuses.

(Formule de M. Verbeeck.)

1°	Chlorure de zinc,	20 centigr.
	Eau distillée,	125 grammes.

On prend quatre cuillerées à bouche de cette solution par jour.

Un ouvrier, qui avait quarante-deux ans, d'une constitution cachectique, fut guéri en trois semaines par suite de l'usage de ce médicament.

2°	Chlorure de zinc,	10 centigr.
	Eau distillée,	125 grammes.

Quatre cuillerées par jour ayant été administrées à une jeune fille scrofuleuse, affectée d'ulcères au cou, il y eut cicatrisation des ulcères en quatre semaines, on avait appliqué à l'extérieur la solution suivante :

Chlorure de zinc,	5 centigr.
Eau,	30 grammes.

188. SOLUTION contre la syphilis invétérée.

(Formule du docteur Borgraeve, de Gand.)

Iodure potassique,	100 grammes.
Eau de fleur d'orange,	1,000 —
Iode,	1 —
Iodhydrargyrate de potasse,	1 —

D'abord un verre à liqueur le matin, puis un verre matin et soir, jusqu'à disparition des symptômes. Par l'action de ce remède, même

dans la constitution la plus délabrée, le malade reprend ses forces et son embonpoint. Le régime doit consister principalement en viandes succulentes et boissons toniques.

Le docteur Burgraeve fait prendre aux malades qui font usage des préparations iodées, de l'huile de foie de morue, et quand la constitution des malades est trop délabrée, il commence le traitement par faire prendre de l'huile jusqu'à ce que les malades puissent supporter les préparations iodées.

189. SOLUTION iodée.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Iodure de potassium, 1 gr. 30 centigr.
Iode, 50 —
Eau distillée, 10 grammes.
Dissolvez.

190. SOLUTION de muriate de baryte et de muriate de fer contre la syphilis et les scrofules.

(*Formule de M. Hufeland.*)

Hydrochlorate de fer, } ãã 2 grammes.
Chlorure de barium, }
Eau distillée, 40 —

Dose de 20 à 60 gouttes.

SUPPOSITOIRES.

191. SUPPOSITOIRE de belladone.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Extrait de belladone, 60 centigr.
Acétate de morphine, 5 —
Beurre de cacao, 6 grammes.

Mêlez pour trois suppositoires.

TAMPONS.

192. TAMPON stupéfiant.

(*Formule de M. Rousseau.*)

Extrait alcoolique de belladone, 10 centigr.
Extrait d'opium, 5 —

On place ce mélange au milieu d'un plumasseau de charpie, on noue avec un fil et on l'introduit dans le vagin jusqu'au col de l'utérus dans les douleurs névralgiques de cet organe. On le laisse pendant vingt-quatre heures.

Dans les métrites douloureuses, accompagnées de leucorrhée, on y ajoute 5 décigrammes de tannin.

TEINTURES.

193. TEINTURE d'acétate de cuivre.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Sulfate de cuivre, 96 grammes.
Acétate de plomb, 120 —

Mêlez exactement et ajoutez :

Eau distillée, 532 grammes.

Faites bouillir dans un vase de cuivre et après refroidissement ajoutez :

Alcool, 346 grammes.

Remuez souvent pendant quatre semaines et filtrez.

194. TEINTURE d'acétate de fer.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Sulfate de fer pur, 92 grammes.
Acétate de plomb, 96 —

Pulvérisez dans un mortier de fer et ajoutez :

Eau distillée, 190 grammes.
Vinaigre de vin, 375 —

Chauffez jusqu'à ébullition dans un vase de fer, et après refroidissement ajoutez :

Alcool, 312 grammes.

Conservez en vase clos pendant plusieurs mois, remuez souvent, et quand la liqueur est rutilante, filtrez.

195. TEINTURE d'armoise.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Racine d'armoise concassée, 157 grammes.
Alcool, 1,000 —
Eau commune, 1,000 —

Faites digérer pendant trois jours, exprimez et filtrez.

196. TEINTURE de chardon marie.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Semence de chardon-marie avec ses téguments 125 grammes.
Esprit-de-vin, 125 —
Eau distillée, 125 —

Faites digérer pendant huit jours et filtrez.

197. TEINTURE de thuya.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de thuya occidental, 189 grammes.
Esprit-de-vin rectifié, 1,500 —

Faites digérer, exprimez et filtrez.

198. **TEINTURE** de benjoin composée, expectorant, stimulant.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Benjoin,	90	grammes.
Storax purifié.	60	—
Baume de Tolu,	30	—
Aloès en poudre,	15	—
Alcool,	1,000	—

Laissez macérer pendant quinze jours, et filtrez à travers un papier-joseph. La dose est de 2 à 8 grammes dans une potion appropriée.

199. **TEINTURE** de chélidoine.

(*Formule de Rademacher. — Pharmacopée hanovrienne.*)

Suc de grande chélidoine récent,	32	grammes.
Alcool,	32	—

Mêlez et filtrez.

200. **TEINTURE** de lobelia inflata contre les maladies chroniques de l'appareil respiratoire.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Lobelie,	120	grammes.
Alcool dilué,	1,000	—

Faites macérer quinze jours, exprimez et filtrez.

On peut aussi la préparer par le procédé de déplacement.

Dose, de 2 à 4 grammes. A plus haute dose il y aurait des vomissements.

201. **TEINTURE** de lupuline contre les érections nocturnes.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Lupuline,	120	grammes.
Alcool,	1,000	—

Faites macérer quinze jours et filtrez.

Dose, de 2 à 8 grammes.

202. **TEINTURE** de phellandre.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Graine de phellandre,	16	grammes.
Esprit-de-vin,	24	—

Faites digérer pendant vingt quatre heures et ajoutez :

Vin muscat, 190 grammes.

203. **TEINTURE** de pulsatille.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de pulsatille récente,	500	grammes.
Esprit-de-vin,	250	—

Macérez pendant huit jours, exprimez et filtrez.

204. **TEINTURE** de rhubarbe et de gentiane, tonique, stomachique et légèrement laxative.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Rhubarbe concassée,	60	grammes.
Gentiane en morceaux,	15	—
Alcool dilué,	1	kilogr.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez et filtrez. On peut la préparer par le procédé de déplacement.

La dose est de 4 à 8 grammes.

205. **TEINTURE** de sanguinaire contre les affections catarrhales de la poitrine.

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Sanguinaire du Canada en morceaux,	120	grammes.
Alcool dilué,	1	kilogr.

Mettez à macérer pendant quinze jours, exprimez et filtrez. On la prépare aussi par l'appareil de déplacement.

La dose est de 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

TISANES.

206. **TISANE** d'aunée contre les maladies de la peau.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Racine d'aunée,	30	grammes.
Eau bouillante,	1	kilogr.

Faites infuser, passez et ajoutez :

Sirop de capillaire, 30 grammes.

Elle convient, pour l'usage intérieur, dans les cas de scrofules, d'impétigo, d'eczéma chronique, chez des enfants lymphatiques, des jeunes filles mal réglées.

207. **TISANE** de bardane contre le prurit.

(*Formule de M. Cazenave.*)

Bardane incisée,	30	grammes.
Eau bouillante,	1	kilogr.

Faites infuser trois heures, passez, décantez et ajoutez :

Sirop de capillaire, 30 grammes.

208. **TISANE** de feuilles de frêne contre la goutte et le rhumatisme.

(*Formule de M. Larue.*)

En décoction.

Feuilles de frêne convenablement séchées,	10 à 20	grammes.
Eau,	200	—

On sucre ou on aromatise, et on la prend par tasses à thé toutes les trois heures, ou seulement le matin à jeun, et le soir après la digestion du dernier repas.

209. TISANE de Pollini.

Brou de noix sec,	75 grammes.		
Salsepareille,	12	—	50 centigr.
Squine,	12	—	50 —
Antimoine cru,	25	—	
Pierre ponce,	12	—	50 —
Eau,	1,500	—	50 —

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié.

A prendre tous les jours par moitié, le matin et le soir, pendant deux semaines à un mois.

TRAITEMENT.

210 TRAITEMENT du rhumatisme articulaire.

(*Formule de M. Bogros.*)

Eau de tilleul,	150 grammes	
Iodure de potassium,	4	—
Teinture de digitale,	2	—
Sirop de morphine,	32	—

F S A une potion qui doit être prise par cuillerée à bouche de trois heures en trois heures : en même temps le malade doit faire usage d'une infusion de tilleul, dans laquelle on ajoute 4 grammes de bicarbonate de soude par litre d'infusion, et l'on pratique sur les membres des embrocations avec un mélange de baume tranquille et d'huile camphrée par parties égales.

TROCHISQUES.

211. TROCHISQUES dégageant de l'iode.

(*Formule de M. Langlebert.*)

Charbon de braise pulvérisé,	20 grammes.	
Azotate de potasse pulvérisé,	4	—

Mêlez, et passez au tamis fin, puis ajoutez :

Iode, 10 grammes.

Mêlez de nouveau en triturant. Le mélange étant parfaitement fait, ajoutez-y une Q. S. d'un mélange très léger de gomme adragante pour faire pâte, puis divisez en 20 trochisques. Faites sécher au soleil ou à l'étuve, mais rapidement, et conserver dans des flacons bien bouchés. Chaque trochisque contient 50 centigrammes d'iode. Il suffit, pour les employer, de les placer sur un fragment de marbre, et de les allumer par leur sommet, ils se consument entièrement en vaporisant l'iode dans l'atmosphère de la chambre du malade.

VINAIGRES.

212 VINAIGRE d'opium (*gouttes noires*).

(*Pharmacopée des États-Unis.*)

Opium en poudre grossière,	248 grammes.	
Muscade en poudre grossière,	46	—
Safran,	15	—
Sucre,	372	—
Acide acétique dilué, ou vinaigre distillé,	Q. S.	

Faites digérer l'opium, la muscade et le safran dans 700 grammes d'acide acétique dilué, au bain de sable, à une douce chaleur, pendant quarante-huit heures, et passez ; faites digérer le résidu avec une égale quantité d'acide acétique dilué de la même manière pendant vingt-quatre heures, versez le tout dans un appareil à déplacement, et versez de nouveau la liqueur filtrée dans l'appareil, à mesure qu'elle passe, jusqu'à ce qu'elle sorte parfaitement claire.

213 VINAIGRE de rue.

(*Pharmacopée hanovrienne.*)

Herbe de rue,	1 partie.
Vinaigre de vin,	6 parties.

Laissez digérer pendant quelques jours, exprimez et filtrez.

FIN DU TROISIÈME SUPPLÉMENT AUX FORMULAIRES.

TABLE DES FORMULES

ET DES

NUMÉROS SOUS LESQUELS ELLES SE TROUVENT.

NOMS DES AUTEURS

DES FORMULES

DU TROISIÈME SUPPLÉMENT AUX FORMULAIRES.

Paris. — Typogr. de E. et V. PENAUD frères, rue du Faub.-Montmartre, 10.